

Горький о лечении туберкулеза.

Множество лишь, страдающихъ туберкулезомъ, обращаются ко мнѣ съ предложеніями сообщить имъ, какимъ образомъ я былъ излеченъ отъ этой болѣзни. Не имѣя возможности отвѣтить каждому отдельно, я прошу васъ, будьте любезны, дать мѣсто въ „Русскомъ Словѣ“ нижеслѣдующему сообщенію моему.

У меня былъ туберкулезъ верхней доли праваго легкаго во второмъ periodѣ и верхней доли лѣваго—въ первомъ, какъ опредѣлили врачи. Выдѣлялось множество гнойной мокроты еъ туберкулезными палочками, общирное присутствіе которыхъ было установлено анализомъ, одѣланнѣемъ вполнѣ авторитетнымъ учрежденіемъ. Были частыя кровохарканья, изнуряющіе поты, сильное исхуданіе, общая слабость, каждую весну и осень—осложненія въ легкихъ. Въ августѣ 1913 г.—обильное кровотеченіе изъ легкихъ.

Въ октябрѣ 1913 г., когда я почувствовалъ себя особенно плохо, на Капри пріѣхалъ докторъ И. И. Манухинъ и, познакомившись со мною, рассказалъ о своемъ методѣ лечения туберкулеза, не скрывая того, что къ лечению людей онъ примѣнялъ методъ своей лишь въ одномъ-двухъ случаяхъ. Я предложилъ ему осмотрѣть меня и, если онъ желаетъ, лечить. Онъ согласился. Послѣ первого же освѣщенія имъ селезенки моей я, спустя нѣсколько дней, почувствовалъ себя значительно лучше. Черезъ мѣсяцъ совершенно исчезли кашель, поты, температура стала нормальной. До декабря 1913 г. мнѣ было сдѣлано всего четыре освѣщенія лучами Рентгена, и къ тому времени вѣсъ мой увеличился на двадцать фунтовъ слишкомъ.

Въ настоящее время я чувствую себя совершенно здоровымъ, несмотря на то, что живу въ Петербургѣ, не считаясь съ предписаннымъ мнѣ режимомъ.

Многіе изъ корреспондентовъ спрашиваютъ: не вызываетъ ли освѣщеніе селезенки лучами Рентгена какихъ-либо болѣзненныхъ ощущеній или первыхъ разстройствъ? Я ничего подобнаго не испытывалъ.

Справляются также о томъ, какова доза лучей. На этотъ вопросъ я не умѣю отвѣтить, но знаю, что точность дозировки играетъ огромную роль въ этомъ методѣ лечения.

М. Горький.

Петербургъ,
14 марта 1914 г.

(„Р. Сл.“)