

ПРИВАВЛЕНІЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

ВЪДОМОСТЯМЪ

№ 28

1. О рожкаахъ (или спорныхъ) пшеницѣхъ въ ржаныхъ колосьяхъ, и болѣзни, происходящей отъ употребленія ихъ въ пищу въ хлѣбѣ.

(Продолженіе.)

I.

Описаніе спорныхъ, или хлѣбныхъ рожковъ, и болѣзни, известной подъ названіемъ злой корки (*garbania torbis, cerealis; ergotisme, Kriebelkrankheit, Kornstaure, Hungerkrankheit*), которая происходитъ отъ употребленія хлѣба, приготовленнаго изъ ржи, незрѣлой, или содержащей въ себѣ примѣсь рожковъ и другихъ веществъ, или пораженной ожогомъ и ржавкою (*ustilago et uredo*). (*)

(*) Профессора и Члена Медико-Хирургической Академіи Доктора Медицины Горявинова.

Спорынья, или хлѣбные рожки (*) (*secale, cornutum, ergot blé ergoté, Mutterkorn*) образуются въ колосьяхъ пшеницы, особенно ржи (шакшевъ цвѣткахъ ячменя и овса), въ дождливое, съ жаркими днями перемежающееся лѣто, изъ неоплодотворенной завязи зерна, чему, по мнѣнію нѣкоторыхъ, способствуютъ еще: уколъ какой-то дужи, высачивающейся клеекая влага и зарождающийся зеленый грибокъ (*sphaelia segetum, Leveillé*) на верхушкѣ зерна. Въ свѣдѣніе сего, завязь разрастается: не въ здоровое хлѣбное зерно, но въ уродливое шѣло, гораздо большее здороваго зерна ржи, длиною иногда около дюйма, снаружи чернo-фіолетовое, внутри болѣе, или менѣе бѣлое, вкуса пригорно-осиравго, что и называется спорынью, или рожками.

(*) См. ниже разныя описанія ея названія.

Въ этой спорыньѣ, или рожжахъ, составныя части муки совершенно измѣняющяся, такъ что Химія выходящъ въ нихъ: жирное масло, живошно—распишленное вещество и сахаръ (какъ въ грибахъ), фиолетовую краску, особенную кислоту (фосфорную) и ядовитый ергоинъ.

Врачи съ недавняго времени начали употреблять спорынью, какъ превосходное лекарство, сильно дѣйствующее на маску, оспаивающее болѣзненные кровотоки и свѣтлеченія. Впрочемъ дѣйствіе спорыньи много зависитъ отъ времени сбора ея и способа хранения, какъ то подтвердилъ и опыты, сдѣланныя Берлинскимъ врачомъ *Клюге*, именно: спорынья, собранная съ колоса, совершенно созрѣваго, оказывала сильное дѣйствіе на человека; а отдѣленная отъ зрѣлыхъ зеренъ дѣйствовала слабо. По наблюденіямъ Лондонскаго врача *Рипри*, спорынья, сохраняемая въ закупоренныхъ сосудахъ, оспаиваетъ дѣйствительно въ продолженіе одного и двухъ годовъ; но выдохшаяся на воздухъ лишается своей дѣйствительности.

Хотя правильное медицинское употребленіе спорыньи не сопровождается вредными послѣдствіями; но примѣсь ея въ хлѣбѣ, особенно приготовленномъ изъ незрѣлой ржи, по многимъ наблюденіямъ, оказалась весьма вредною для здоровья. Это объясняется во 1-хъ тѣмъ, что спорынья, намоченная водою, очень скоро произво-

дитъ гнилостное броженіе, сопровождаемое особеннымъ запахомъ; во 2-хъ пошому, что хлѣбъ изъ муки, особенно незрѣлаго зерна, содержащій въ себѣ примѣсь спорыньи, не выпекается надлежащимъ образомъ, не поднимается, но оспаивается вязкимъ и тѣснливымъ.

Основываясь на такихъ свойствахъ спорыньи, Саксонское Правительство, въ 1829 году, издало официальное предписаніе: какъ уменьшать вредъ, происходящій отъ употребленія ржи, содержащей въ себѣ не большую примѣсь спорыньи. Въ немъ предлагается: 1) снопы ржи, лежашіе во влажныхъ мѣстахъ гумна, провѣтривать на воздухѣ; 2) хранить рожь въ сухомъ мѣстѣ; 3) поджаривать ее умѣренною предъ смолотьемъ в муку; 4) отсырѣвшую ржаную муку, также поджаривать; 5) такъ какъ шѣсто изъ муки, зараженной спорыньею, не даетъ рыхлаго хлѣба, то при печеніи его прибавлять всегда закваску, или даже на каждый фунтъ хлѣба—по полулозошнику чистаго пошаша. Полезна также примѣсь къ хлѣбу ячменя, кишенца или янса.

Признаки и признаки злой корги, или рафани, и легеніе ея.

Сія болѣзнь появляется обыкновенно осенью, послѣ дождливаго жаркаго лѣта, въ мѣстахъ низменныхъ и влажныхъ, особливо—когда не дозрѣваете рожь, или содержишь въ себѣ

мною спорыши, или рожковъ. Въ городахъ сей болѣзни почти никогда не бываешь; она большею частію являеся въ селеніяхъ, гдѣ жилили, не зная на незрѣлость и нечистоту ржаныхъ сѣмянъ, упошребляющъ ихъ въ пищу.

Латинское названіе происходитъ отъ растенія, весьма обыкновеннаго и извѣстнаго у насъ подъ названіемъ сурьпицы (*raphanus raphanistrum*), кою рой сѣмянъ Липей несправедливо приписывалъ происхожденіе *рафанія*. Другіе объявили сѣмена одуряющаго плевела (*lolium tomentum*), ржаннаго костера (*bromus secalinus*), куколи (*agrostemma githago*), полевой чернушки (*nigella arvensis*), полевой шорлицы (*spercula arvensis*), вилкой ожиги (*ustilago segetum*) и проч., что подленишь сомнѣнію. Но всѣ единогласно полагають причину болѣзни въ худомъ качествѣ и недосыткѣ хлѣба, въ незрѣлости ржи и въ примѣсѣ спорыши, или рожковъ.

Эта не новая болѣзь обратила на себя особенное вниманіе врачей и Правительствъ съ 1577 и 1588 годовъ, когда она свирѣпствовала въ Гессенѣ и Силезіи; съ большою силою она развивалась въ разныхъ частяхъ Германіи, въ 1648, 1649 и 1675, въ 1709, 1716, 1717 и 1736 годахъ, и съ особенною жестокостію во Франціи, такъ что изъ 120 больныхъ выздоравливало едва пять. Въ 1770 и 1771 годахъ, она появилась вновь въ Нижней Саксоніи, а въ 1834 году въ

Германіи; въ тоже время, свирѣпствуя въ разныхъ губерніяхъ Россіи, обратила на себя и здѣсь особенное вниманіе Правительства.

Рафанія, или злая корча, обнаруживаеся вообще перемежающимися судорогами, которыми, большею частію предшествоють: онемѣніе членовъ, съ чувствомъ какъ бы ползанія мурашекъ (*formicatio*), или жестокой боли; обмороки, боль, подъ ложечкою и желчная рвоша. Прочіе припадки различествують по мѣсту происхожденія болѣзни и особымъ свойствамъ страждущаго, такъ что удобно различаются два главные вида ея: рафанія скоротечная и хроническая.

Скоротечная рафанія (*raphania acuta*) обыкновенно сопровождается лихорадкою. Болѣзь начинаеся жестокою тоскою, приводящею больнаго въ ошачаніе, болью въ головѣ и подъ ложечкою; чувство ползанія мурашекъ начинаеся въ снивѣ, потомъ распространяеся на живощъ и конечности, перзаемя перемежающимися судорогами. Когда такія судороги объемлють брюшныя внутренности, то происходишь пошвоша, рвоша и поносъ, съ обильными испращеніями глистовъ. Въ послѣдствіи времени чувства прищупляюся, обмороки и шумъ въ ушахъ усиливаюся, слухъ ослабваетъ. Послѣ одиннадцатаго до 20 дня, болѣзь обыкновенно уменьшаеся, но больнои еще не въ окончности: обмороки продолжаюся, памияшъ пропадаеся, обнаруживаеся шу-

поуміе (saluitas), или разныя сыпи на кожѣ (exanthemata, petechiae); а при болѣе быстромъ ходѣ болѣзни, замѣченною особенно во Франціи, персты, пораженные сухимъ аншоновымъ огнемъ, и даже цѣлыя члены, опадають (necrosis ustilaginea, Sauvages).

Хронической рафаніи предшествуютъ: чувство ползанія муравьевъ и жестокия боли въ конечностяхъ. При соединеніи въ послѣдствіи судороги и конвульсіи наблюдаютъ нѣкоторый порядокъ (typus), возвращаясь ежедневно три или четыре раза, и оставая на нѣсколько часовъ члены въ безчувствіи. Позывъ на пищу исчезаетъ, или мапротивъ больные перзаются жестокою болью подъ ложечкою и неуполнимымъ голодомъ; шакъ что съѣдаютъ все, что ни попалось, даже собственные испраженія.

При благополучномъ исходѣ болѣзни, судороги возвращаются рѣже и рѣже; при медленномъ — сила очень исчезающая, происходитъ: параличь, омертвѣніе персторовъ и гангренозныя пузыри (emphigus), причинающіе смерть; или же болѣзнь переходитъ въ шупоуміе и энцефалію. Болѣзнь обыкновенно разрѣшаея обильнымъ потомъ, или критическимъ слюшеченіемъ; или же переходитъ въ продолжительную, злокачественную, лихотворазную чесотку и язвы.

Изъ сего видно, что въ рафаніи первоначально поражаются пищеварительные органы и жервы; въ послѣдствіи развивается нервная, ши-

фозная, сопровождаемая глнстами, или слизистая горячка (febris ptyuosa acuta v. pituitosa, torpida), или медленная, истощительная (febris hectica, lenta), съ помертвѣніемъ персторовъ, простирающимся иногда до коленного и локтеваго суславовъ и далѣе.

Легеніе рафаніи. Главное пособіе состоитъ въ томъ, чтобы удалить изъ шѣла вещества, причинающія болѣзнь; уничтоживъ вредное влияние ихъ на здоровье, и прекративъ употребленіе хлѣба, приготовленнаго изъ рни нездорьмой, или смѣшанной съ рожками и плевеломъ.

И шакъ, если болѣзнь началась недавно, первая обязанность врача состоитъ въ употребленіи шакныхъ средствъ, кои, изгоняющія вредныя вещества, находящіяся въ желудкѣ и кишкахъ. Для сего, въ первомъ періодѣ болѣзни, должно дать рвотное изъ пнекакуанъ съ рвотною солью (S), въ достаточномъ, возрасту и сложности болѣзни соразрнромъ количествѣ. После рвотнаго дающа большому аромашныя горьковатая травы, въ видѣ чая; для сего могутъ быти избираемы: римская и просида ромашка, мята, шисядешишникъ, меліса, шалфей. На другой, или шрешій день, а иногда и прежде, пушно дашь слабительное изъ клещевинаго масла (oleum ricini); англійской соли съ ревенемъ, или алек-

(S) Или же, за невѣрнѣемъ сихъ средствъ — до получанія пошнаго (коноплянаго, или льнянаго) масла, съ ложкою меда.

вандрійскимъ листомъ, или даже изъ яланты. Дѣйствию сихъ средствъ изгоняюся иногда глицы и множештво клейкихъ мокрощъ, съ явственнымъ уменьшеніемъ припадковъ. Если припадки не дозволяютъ давать слабительныхъ, то употребленіе промывательныхъ, съ уксуомъ и ароматными травами, можетъ быть весьма полезно.

Для уличшоженія вреднаго дѣйствія болѣзненной причины на организмъ необходимы противосудорожныя и укрѣпляющія средства, между коими преимущественно полезны: валеріана, ангелика (дигиль), ирный корень, ариика, хила съ прибавленіемъ Миндерева спирта изъ янтарнаго оленьяго рога (Liquoris conuocervi succinati). Гофмановыхъ капель септистрѣрнаго спирта, spiritus nitri dulcis, камфоры, асафетиды, дѣлая выборъ изъ числа сихъ средствъ сообразно сложенію больнаго, свойству и формѣ болѣзни. Кровопусканіе пользы не оказываетъ; но если стѣненіе въ груди сильно, и приливъ и скопленіе крови въ головѣ явственны, то не бесполезно приспавлять ливенцы къ вискамъ и за уши.

Для наружнаго употребленія можно совѣтовать тренія камфорнымъ спиртомъ, или уксуомъ, пеннымъ масломъ съ камфорою, или жипкимъ скипидаромъ. Употребленіе теплыхъ ваннъ съ ѣиною пруходою, ароматными травами, золою, или поашемъ, и обыкновенныя бани не бесполезны, особенно для

уничшоженія судорогъ и оривитія въ члвахъ. На смръзляющіяся язвы на рукахъ и ногахъ прикладывающа: масло съ воскомъ, или Арцеевъ бальзамъ. Кршическая ческа излечивается: стрнымъ цѣшомъ и сурмяками — препаратами, дѣланными внутрь, и наружнымъ употребленіемъ мази изъ сѣло-осадочной ртуты, при помощи ваннъ, или бани.

Питье должно быть кисловатое, на примѣръ: не слишкомъ слабый квасъ съ мятою, приготовленный изъ муки хорошаго качества; клюковный, или брусничный съ водою, и обыкновенная вода съ малымъ количествомъ укуса.

Но всѣ сіи средства останутся щещны, если худой хлѣбъ не будетъ замѣненъ хорошимъ, и больнымъ не будетъ даваться здоровая пища: изъ говядины, разныхъ крупъ, каршофеля и другихъ огородныхъ плодовъ и кореньевъ. Хорошее пиво и настоящее не подмѣшанное виноградное вино также могутъ быть полезны.

(Продолж. въ слѣд. №)

в. О приваиваніи и выкаиваніи.

(съ 1 по 8 число Іюля 1839 года.)

Прибыли: изъ села Лыкова—Дѣйствительный Камергеръ Князь Грузинскій, изъ Княгининскаго уѣзда—Дѣйствительный Сташскій Совѣтникъ Прутченко, изъ Перми—Коллежскій Совѣт-

никъ *Протопоповъ*, изъ Казани—Полковникъ *Энилобахъ*, изъ С. Пешербурга—Надворный Совѣтникъ *Андреевъ*, Коллежскій Ассесоръ *Жеребцовъ*, Титулярные Совѣтники: *Михайловъ* и *Климовъ*, изъ Арзамаса—Маіоръ *Сидомоне*, изъ Балахны—Коллежскій Ассесоръ *Кузнецовъ*, изъ Владимира—Штабс-Ротмистръ *Рвештинскій*, изъ Горбашова—Штабс-Капитанъ *Каратаевъ*, изъ С. Пешербурга—Коллежскій Ассесоръ *Бблоусовицъ*, изъ Казани—Чиновникъ 9 класса *Сухотинъ*, съ Богородской присяжн—Поручикъ *Юшковъ*, изъ Арзамаса—Подпоручикъ *Фроловъ*, изъ Василя—Чиновникъ 9 класса *Заваровъ*, остановились Кремлевской части; изъ Казани—Чиновникъ 9 класса *Рена-*

больнъ, остановился Макарьевской части.

Выѣхали: въ Уфу—Коллежскій Ассесоръ *Климовъ*, въ С. Пешербургъ—Коллежскій Ассесоръ *Бблоусовицъ*, въ Арзамасъ—Маіоръ *Сидомоне*, въ Арзамасъ же—Поручикъ *Буланинъ*, въ Тифлисъ—Пранорщикъ *Лоренцо*, въ Мипскъ—Полковникъ *Энилобахъ*, въ Василь—Штабс-Капитанъ *Каратаевъ*, въ С. Пешербургъ Чиновникъ 9 класса *Сухотинъ*, въ Арзамасъ—Подпоручикъ *Фроловъ*, въ С. Пешербургъ—Коллежскій Совѣтникъ *Протопоповъ*, въ Балахну Поручикъ *Мелкозеровъ*.

Метеорологическія наблюденія, дѣланныя при Нижегородской Губернской Гимназій съ 25-го
Юля по 2 число Авгла 1839 года.

Дни мѣсяца по справку шпалю.	9 ЧАСОВЪ УТРА.				ПОЛУДНЬ.				3 ЧАСА ПО ПОЛУДНЬ.				9 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.			
	Барометръ въ миллиметрахъ.		Термометръ.		Барометръ въ миллиметрахъ.		Термометръ.		Барометръ въ миллиметрахъ.		Термометръ.		Барометръ въ миллиметрахъ.		Термометръ.	
	При боро- вѣтрѣ на воздухѣ.	Резюмѣ на воздухѣ.	Направленіе и сила вѣт- ра и состо- яніе неба.		При боро- вѣтрѣ на воздухѣ.	Резюмѣ на воздухѣ.	Направленіе и сила вѣт- ра и состо- яніе неба.		При боро- вѣтрѣ на воздухѣ.	Резюмѣ на воздухѣ.	Направленіе и сила вѣт- ра и состо- яніе неба.		При боро- вѣтрѣ на воздухѣ.	Резюмѣ на воздухѣ.	Направленіе и сила вѣт- ра и состо- яніе неба.	
15.	746,2.	18,9.	16,5.	ЮЗ. 2. об- лачно.	746,8.	19,4.	19,7.	ЮЗ. 2. ма- лая облака.	747,4.	20,2.	18,8.	ЮЗ. 1. ма- лая облака.	748,6.	19,4.	18,1.	ЮЗ. 1. ма- лая облака.
26.	750,9.	20,0.	16,7.	Тихо об- лачно.	751,1.	19,3.	19,8.	ЮВ. 1. об- лачно.	752,6.	19,7.	20,0.	ЮЗ. 1. об- лачно.	755,9.	19,2.	17,8.	Тихо ма- лая облака.
27.	754,4.	19,8.	19,1.	Тихо ма- лая облака.	754,8.	20,3.	24,9.	Тихо об- лачно.	755,3.	20,2.	21,8.	Тихо ма- лая облака.	755,9.	20,0.	18,1.	Тихо ма- лая облака.
28.	756,6.	20,7.	18,4.	Тихо чис- ло.	757,4.	24,4.	22,3.	Тихо ма- лая облака.	758,2.	24,0.	23,7.	Тихо ма- лая облака.	758,7.	24,2.	18,3.	Тихо ма- лая облака.
29.	758,9.	27,3.	19,4.	Тихо чис- ло.	759,0.	23,7.	24,5.	Тихо чис- ло.	759,0.	23,9.	23,6.	Тихо чис- ло.	759,2.	22,9.	22,0.	Тихо чис- ло.
30.	759,2.	22,4.	19,0.	Тихо чис- ло.	759,7.	24,6.	24,9.	Тихо чис- ло.	759,9.	26,6.	24,8.	Тихо ма- лая облака.	759,5.	27,5.	22,2.	Тихо чис- ло.
1. Авгла.	759,0.	23,4.	20,8.	Тихо ма- лая облака.	758,7.	23,7.	25,6.	Тихо чис- ло.	758,9.	24,0.	23,6.	Тихо чис- ло.	757,4.	25,3.	22,8.	Тихо чис- ло.

Наблюдатель, Службный учитель Гимназій, Георгій Шнейдъ.